

AUTORIDAD SANITARIA LLAMA A LA PREVENCIÓN

Preocupa aumento de casos de Hepatitis A en la región

Cifras de la Seremi de Salud de Ñuble dan cuenta de diez casos más que igual período del año pasado y casi un 15% en el incremento de consultas médicas por cuadros de diarrea.

LA DISCUSIÓN
diario@ladiscusion.cl
FOTOS: LA DISCUSIÓN

Unaumento registran los casos de hepatitis A en la región, situación que llevó a la seremi de Salud a levantar un llamado a la prevención entre la población.

Según datos de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud de Ñuble, hasta la semana epidemiológica 33 (que finalizó el 17 de agosto), la región ha acumulado 17 casos de Hepatitis A, lo que representa un incremento en comparación con el mismo período del año pasado, cuando se registraron 7 casos. Asimismo, el monitoreo de vigilancia en los dispositivos de urgencia de la Red Asistencial de Ñuble ha mostrado un aumento en las consultas por cuadros de diarrea, con un total

Síntomas “tardíos”

Es importante destacar que los síntomas suelen aparecer entre 20 y 30 días después del contagio, aunque en algunos casos pueden tardar hasta 50 días. Por ello, la recomendación es prevenir y, ante la aparición de síntomas, consultar de inmediato a un médico para una evaluación, apuntó la seremi.

de 416 consultas en la semana epidemiológica 33, lo que equivale a un aumento del 14,92% respecto a la semana anterior.

La encargada de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud, Claudia Dospital explicó que “la Hepatitis A se transmite principalmente por vía fecal-oral, ya sea a través del consumo de agua o alimentos contaminados, o por



El lavado de manos sigue siendo fundamental para prevenir la enfermedad.

contacto directo con personas u objetos infectados. Este tipo de transmisión es más común en áreas con condiciones de saneamiento ambiental deficientes”.

Por su parte, la Seremi de Salud, Ximena Salinas, reforzó el llamado a prevenir esta enfermedad entre la población; “es muy importante en la comunidad que se refuercen las conductas de seguridad como son el lavado de manos frecuente con agua y jabón, adquirir o consumir alimentos sólo en locales comerciales autorizados por la Autoridad Sanitaria; consumir carnes, pescados y mariscos bien cocidos; lavar muy bien frutas y verduras, especialmente si se comen crudas; consumir sólo agua potable y vacunar a los niños de 18 meses de edad de acuerdo calendario del programa nacional de inmunización, disponible desde 2018. Estas medidas pueden prevenir la transmisión del virus”.