

# En la región se han detectado 262 casos nuevos de VIH

Las autoridades hicieron el llamado a la prevención y a realizarse el autotest que es gratuito.

Fabiola Vega Molina  
La Estrella

**D**urante 2023, 203 varones, 51 mujeres y 8 personas transgénero, fueron notificados como portadores del VIH en la región, llegando así a un total de 262 casos nuevos de acuerdo al último reporte oficial.

El seremi de Salud, Alberto Godoy, señaló que esta tendencia se ha mantenido durante los últimos 2 años.

En relación a las cifras de contagios y el detalle en de los últimos años, la autoridad explicó que según la información entregada por el Departamento de Salud Pública de la Autoridad Sanitaria, muestra que el porcentaje de nuevos casos asociados al sexo masculino fluctúan entre un 76% y 77,5% durante los últimos 3 años reportados (2021 - 2023); el sexo femenino muestra una varia-



LAMAN A REALIZARSE EL AUTOTEST DE FORMA GRATUITA.

ción del 19% al 22,6% en igual periodo, mientras que la población transgénero entre un 1% y un 3%.

En cuanto a los grupos más afectados, Godoy precisó que el rango con más casos nuevos, se encuentra entre los 20 y 44 años, quienes representan en promedio, el 78%, aunque también aparecen personas mayores de 60 años, inclusive entre 75 y 79 años.

Ante la información entregada, la autoridad sanitaria realizó una feria ciudadana preventiva, en la que participó la Agrupación de Personas viviendo

con VIH, "Nueva Aura" donde se recordó la importancia de la prevención, recalcando que la enfermedad está plenamente vigente y la necesidad del uso del preservativo y de la detección temprana del virus.

Y para esto, señalaron que se puede hacer mediante los autotest, prueba que los interesados pueden realizar en la comodidad de su hogar, sin tener que acudir a un centro de salud.

"La detección temprana permite que el paciente tenga un tratamiento más oportuno y eficaz, contenido por cierto en el Régimen

de Garantías Explícitas en Salud (GES)", dijo Godoy.

El autotest - disponible de manera gratuita en la atención primaria, hospitales comunitarios y el Injuv, entre otros organismos - consiste en un procedimiento sencillo que se desarrolla en aproximadamente 15 minutos.

Sus resultados no constituyen un diagnóstico definitivo de VIH. No obstante, de resultar "reactivo", la persona debe acudir a un centro de salud para que se someta a un nuevo análisis por parte de personal capacitado. ✨

Corresponsal