



Araña de rincón: consejos para prevenir una posible mordedura

En Chile, uno de los arácnidos más temidos es la araña de rincón (*Loxosceles laeta*). Su mordedura puede ser peligrosa y, en casos graves, poner en riesgo la vida.

La araña de rincón es una especie común en Sudamérica, mide entre 1 y 3 cms. y es de color marrón. Su cuerpo tiene forma similar a un violín en la parte dorsal y se desplaza con gran rapidez. Suele estar más activa durante la primavera y

el verano, ya que es su período de reproducción.

Como su nombre indica, esta araña prefiere los rincones, lugares oscuros, secos y poco frecuentados, como detrás de muebles, cuadros o lavaplatos, dentro de zapatos y ropa guardada por mucho tiempo, grietas en techos y paredes, armarios o bodegas poco transitados. Por lo mismo, es importante revisar estas áreas con frecuencia, especialmente

en épocas cálidas.

“La mordedura de la araña de rincón suele ser dolorosa, aunque en algunos casos puede pasar desapercibida, los síntomas aparecen entre 2 y 18 horas después de la mordida, y las reacciones se clasifican en: reacción cutánea (piel) donde podemos observar inflamación, enrojecimiento con un borde azul grisáceo y un centro violáceo en la zona afectada. La gravedad depende del tamaño de

la araña, la persona y la cantidad de veneno”, explica Claudia González, académica de la Escuela de Enfermería de Universidad de Las Américas.

También añade que después de “12 a 24 horas la persona puede presentar dolores musculares y articulares, palpitaciones, fiebre alta, náuseas, vómitos, piel amarilla (ictericia) y sangre en la orina”.

Según el Ministerio de Salud (Minsal), la letalidad de la morde-

dura de araña de rincón con reacción cutáneo visceral depende en gran parte de la precocidad de su diagnóstico y manejo oportuno. Se debe controlar durante las primeras 24 a 48 horas y estar atentos a la aparición de síntomas y signos sugerentes del cuadro visceral. Además, el tamaño y características de la lesión cutánea, no guarda relación alguna con la aparición o severidad del compromiso sistémico.

Al ser mordido por esta araña, hay que actuar rápidamente lavando la zona afectada con agua y jabón y aplicar hielo de forma indirecta (envuelto en un paño) para disminuir la velocidad de reacción al veneno. Asimismo, se debe permanecer tranquilo e ir al servicio de urgencia más cercano. Si es posible, capturar la araña y llevarla al centro de urgencia para facilitar su identificación.