

# Dosis de refuerzo puede reducir a cero el riesgo de ingreso a UCI y mortalidad

**ALTA PROTECCIÓN.** Investigador de la Universidad Mayor se refiere a la alta eficacia de la tercera vacuna, en base a las cifras presentadas en los informes del Minsal.

Carolina Torres Moraga

Vacunarse con la dosis de refuerzo tras haber completado el esquema original de dos dosis o monodosis en el caso de CanSino, puede reducir a cero el riesgo de ingresar a una UCI y de morir como consecuencia de la infección por covid-19.

Así lo manifiesta el doctor en Microbiología e investigador del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, Sebastián Reyes, quien calificó como "absolutamente necesaria" la administración de la tercera vacuna, en especial frente al aumento sostenido que están experimentando los casos en las distintas regiones, donde mucho tiene que ver la alta cifra de "rezagados" de la dosis de refuerzo.

"Las cifras nos demuestran que claramente la protección de la vacuna es muy buena (...) porque se observa una notable baja en los casos de mortalidad e ingreso a UCI", destaca el investigador, quien se basa en las cifras que a lo largo de las últimas semanas ha liberado el Minsal en los informes sobre "Incidencia y gravedad de casos de covid-19 según antecedente de vacunación".

En el informe N° 14 publicado la última semana (10 de noviembre) con los antecedentes desde el 31 de octubre al 6 de noviembre, se observa que la incidencia de mortalidad es igual a cero en la mayoría de los grupos etarios, en el caso de la población vacunada con dosis de refuerzo mayor a 14 días.

La excepción a lo anterior es el grupo de 81 años y más, que presenta una incidencia de mortalidad de 1,3 por 100 mil habitantes en el período antes señalado. Entre 61 y 70 años, la tasa es de 0,1 por 100 mil habitantes



AGENCIA UNO

**7 millones de dosis** de refuerzo han sido administradas hasta la fecha en el país. Todas las personas vacunadas con distintas fórmulas, deben recibirla.

tección es muy alta al contar con la tercera dosis, disminuyendo enormemente el riesgo de mortalidad o de caer en una UCI", enfatiza el doctor Reyes, quien a la vez aclara que la protección entregada por las dos primeras dosis o la dosis única de CanSino, si bien ayudó, "ya se ha reportado que esa protección decae a partir de los 4 a 6 meses luego de la aplicación de la segunda dosis, por tanto esta dosis de refuerzo es sumamente necesaria que se aplique".

A su juicio, tras haber transcurrido 6 meses de completar el esquema, la inmunidad decae ostensiblemente, lo que es más notorio en el caso de las personas mayores de 55 años. "Algo de inmunidad queda, pero la protección es mucho menor y las personas se vuelven vulnerables. Nuestro sistema inmunológico requiere de este entrenamiento adicional para poder estar preparado frente a lo que estamos viendo hoy en día con este aumento de los casos", dice. En opinión del experto, efectivamente la población se ha relajado, lo que es muy riesgoso. "Se ve gente en la calle transitando que ya no usa mascarilla, siendo la principal herramienta junto a las vacunas para prevenir los contagios, porque si una persona está contagiada y es asintomática, el no uso de mascarilla hace que pueda liberar partículas infecciosas hacia su alrededor. Además, las mayores libertades requieren de una mayor prudencia y responsabilidad, lo que lamentablemente no está ocurriendo", cierra.

A PARTIR DEL 1 DE DICIEMBRE, LOS MAYORES DE 45 AÑOS DEBERÁN TENER LA DOSIS DE REFUERZO PARA PODER HABILITAR SU PASE DE MOVILIDAD. DE LO CONTRARIO, EL DOCUMENTO PERMANECERÁ BLOQUEADO.



Se ve gente en la calle transitando que ya no usa mascarilla, siendo la principal herramienta para prevenir los contagios junto con las vacunas, porque si una persona está contagiada y es asintomática, puede liberar partículas infecciosas".

Sebastián Reyes,  
 Doctor en Microbiología e  
 investigador Centro de  
 Genómica U. Mayor

## Mayores de 45 años deberán recibir la dosis de refuerzo para habilitar el Pase

• A partir del próximo 1 de diciembre los requisitos en relación al Paso a Paso sufrirán una modificación. De acuerdo a lo informado ayer por el ministro de Salud, Enrique Paris, la modificación consistirá en que "se les exigirá a los mayores de 45 años, que ya hayan cumplido los 6 meses desde que se pusieron su segunda dosis o dosis única, tener puesta su dosis de refuerzo para tener habilitado su Pase de Movilidad. Si pasan estos seis meses desde que las personas mayores de 45 años completaron su esquema y no se han puesto su dosis de refuerzo, se les va a inhabilitar su Pase de Movilidad y se les volverá a activar una vez que se coloquen la vacuna", dijo.

y en todo el resto de los grupos de edades, es igual a cero.

En cuanto a la incidencia de casos confirmados de SARS CoV-2 ingresados a UCI según estado de protección vacunal, las cifras muestran incidencias

iguales a cero en la mayoría de las edades con tercera dosis más 14 días; con la sola excepción de 41 a 50 años (0,1 por 100 mil habitantes) y de 51 a 60 años (0,1 por 100 mil).

"Esto demuestra que la pro-