

Cómo Prevenir y Actuar Ante una Picadura de Araña de Rincón

La araña de rincón (*Loxosceles laeta*) es una de las arañas más peligrosas en América del Sur. Su mordedura puede tener consecuencias graves si no se trata de manera adecuada. A continuación, se presentan consejos para prevenir sus picaduras y pasos a seguir en caso de ser mordido.

Prevención de Picaduras

1. Revisión y Limpieza del Hogar: - Inspección Regular: Revisa los rincones, detrás de muebles y dentro de los armarios donde la araña de rincón suele esconderse. - Limpieza Profunda: Mantén las áreas oscuras y polvorientas del hogar limpias, y mueve los muebles regularmente para evitar que se conviertan en escondites.

2. Medidas de Seguridad en la Ropa y Cama: - Sacudir Ropa y Ropa de Cama: Antes de usar, sacude prendas, sábanas y zapatos, especialmente si han estado guardados por un tiempo. - Ropa de Protección: Cuando realices tareas de limpieza en áreas donde pueden habitar arañas, utiliza guantes y ropa de manga larga.

3. Uso de Barreras: - Sellado de Grietas: Sella grietas en paredes y puertas para evitar que las arañas entren a tu hogar. - Instalación de Mallas: Coloca mallas en las ventanas y puertas para impedir la entrada de insectos que sirvan como alimento para las arañas.

4. Control de Plagas: - Eliminar Insectos: Usa medidas

de control de plagas para reducir las poblaciones de insectos que son alimento de las arañas.

¿Qué Hacer en Caso de una Picadura?

1. Identificación de una Picadura de Araña de Rincón: - Síntomas Iniciales: Pueden incluir dolor leve, picazón y enrojecimiento en el sitio de la mordedura. Con el tiempo, es posible que se desarrolle un área pálida rodeada de un anillo rojo.

2. Acciones Inmediatas: - Lavar el Área: Lava la zona afectada con agua y jabón para reducir el riesgo de infección. - Aplicar Hielo: Usa una compresa fría sobre la mordedura para minimizar el dolor y la hinchazón.

3. Cuándo Buscar Ayuda Médica: - Observación de Síntomas: Si se presenta dolor intenso, fiebre, náuseas o un color azulado alrededor de la mordedura, busca urgentemente atención médica. - Seguimiento Médico: Es crucial recibir tratamiento adecuado, ya que las picaduras pueden causar complicaciones como la necrosis del tejido en casos severos.


4. Tratamiento Médico: - Antiveneno y Hospitalización: En casos graves, puede ser necesario el uso de antiveneno y hospitalización para manejo del dolor y tratamiento de complicaciones. - Cuidado de la Herida: Los médicos pueden limpiar la herida y proporcionar medicamentos como antibióticos o analgésicos según



Derechos Reservados © Nelson Candeza 2009

sea necesario. Prevenir una mordedura de araña de rincón requiere una combinación de métodos de limpieza, control de plagas y precauciones

personales. En caso de una picadura, actuar rápidamente y buscar atención médica puede hacer una diferencia significativa en el impacto de la mordedura.



"Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos"
Hageo 2:7



"Lo único que adquieres durante tu vida y que va contigo después de morir, son