

# Seremi de Salud entrega recomendaciones para prevenir la Viruela del Mono

**SALUD.** *La vacuna contra la Monkeypox (Mpox) continúa administrándose para prevenir la enfermedad en los grupos objetivos.*

El 14 de agosto la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la Viruela del Mono como una Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional (ESPII), tras el aumento de casos confirmados en África central. Se trata de una nueva variante de esta enfermedad, conocida como Mpox Clado 1.

Según explica la Seremi de Salud de Atacama, Jéssica Rojas,

“la Viruela del Mono o Mpox es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Esta enfermedad puede transmitirse de varias maneras: a través de la placenta, el contacto físico con personas infectadas, el contacto con materiales contaminados y, en ocasiones, el contacto con animales infectados. Aunque muchas personas se recuperan completamente, algunos casos pueden ser graves y, lamenta-

blemente, fallecen. Por eso, es importante evitar situaciones de riesgo y que la comunidad esté informada sobre los síntomas de la Viruela del Mono y ante cualquier duda o consulta llamen al Fono Salud responde, que es el 600 360 7777”.

Los síntomas de la Viruela del Mono son lesiones de la piel o de las mucosas, que pueden ser planas o elevadas y llenas de líquido, que tienden a concen-

trarse en la cara, palmas de las manos, plantas de los pies, boca, el área genital y anal. Estas lesiones forman costras que luego se secan y se caen. También, una persona infectada con esta enfermedad puede tener fiebre sobre los 38,5°C, ganglios inflamados, dolor de cabeza, dolores musculares y falta de energía. Quienes pueden acceder a la vacuna contra la Viruela del Mono son por preexposición

trabajadores y trabajadoras sexuales, personal de la salud (laboratorio), personas que vivan con VIH, hombres que tengan sexo con hombres, sin importar la edad, orientación sexual o identidad de género.

Por post exposición, personas inmunosuprimidas, personas viviendo con VIH, embarazadas en cualquier etapa de gestación, otros grupos poblacionales que sean contacto estrecho de una persona infectada con Mpox.

El proceso de inoculación se desarrolla con dos dosis, las cuales se deben llevar a cabo en un transcurso de 28 días. En Atacama, el punto de vacunación contra la Viruela del Mono es el Hospital Regional San José del Carmen de Copiapó. ☞