

Beneficios y peligros en el uso de antipiréticos

También conocidos como antitérmicos, los antipiréticos son comúnmente utilizados para reducir la fiebre y aliviar las molestias asociadas y, si bien son considerados seguros cuando se utilizan correctamente y en las dosis recomendadas, su uso inadecuado puede acarrear peligros significativos para la salud. requieren de un uso responsable.

Aquellos como el paracetamol, ibuprofeno y diclofenaco actúan sobre el centro regulador de la temperatura en el cerebro, disminuyendo la fiebre y proporcionando alivio. Además, su acción analgésica contribuye a reducir el malestar general, asociado con enfermedades infecciosas como la influenza y los resfríos comunes.

Su fácil acceso y bajo costo los ubican entre los más consumidos por la población. Se pueden encontrar en comprimidos, cápsulas blandas, suspensiones o soluciones para vía oral. A pesar de la creencia popular, no se recomienda el uso de supositorios antipiréticos; estos deben solo administrarse en caso de vómitos o problemas evidentes de deglución.

Uno de los riesgos más importantes es la posibilidad de sobredosis, especialmente en el Paracetamol, cuya ingesta excesiva puede causar daño hepático grave e incluso poner en peligro la vida del paciente. El uso prolongado o frecuente de antipiréticos también puede tener efectos adversos en la salud gastrointestinal, renal y cardiovascular.

Para evitar riesgos se debe respetar la dosis y frecuencia recomendadas por el médico o químico farmacéutico. No exceder las dosis máximas ni usarlos de manera continua sin supervisión. Se aconseja limitar su uso a tres días seguidos y solo cuando sea necesario. Si tienes dudas, especialmente si se trata de niños, ancianos o personas con condiciones médicas, se recomienda consultar a un profesional de la salud.

Considera alternativas como compresas frías, ropa ligera y buena hidratación. Evitar combinar varios antipiréticos sin supervisión médica para prevenir riesgos y complicaciones. Se debe observar de cerca la evolución de los síntomas, especialmente si la fiebre persiste o no cede con el tratamiento habitual. Ante falta de mejoría o nuevos síntomas, buscar atención médica inmediata. Es esencial abordar, además, las contraindicaciones o situaciones en las que su uso está desaconsejado. En personas con alergias conocidas a los principios activos de los antipiréticos, como el paracetamol o el ibuprofeno, se pueden desencadenar reacciones alérgicas graves. Qui-



CARLOS MEZA FIGUEROA
Académico Química y Farmacia
Universidad Andrés Bello, Concepción

El conocimiento y la comprensión de las contraindicaciones, son fundamentales para garantizar un uso seguro y efectivo de estos fármacos.

nes presentan enfermedades hepáticas graves, como la hepatitis crónica o la cirrosis, deben evitar el uso de paracetamol, ya que altas dosis o el uso prolongado pueden causar daño adicional e incluso provocar insuficiencia hepática.

El uso de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno, está contraindicado en personas con úlceras gástricas activas o antecedentes de hemorragias gastrointestinales. Estos medicamentos pueden aumentar

el riesgo de complicaciones gastrointestinales graves. Algunos antipiréticos pueden tener restricciones específicas durante el embarazo y la lactancia. Por ejemplo, el ibuprofeno está contraindicado en el tercer trimestre del embarazo y puede pasar a la leche materna durante la lactancia, lo que podría afectar al bebé.

Las personas con insuficiencia renal moderada a grave, deben tener precaución al usarlos, espe-

cialmente el ibuprofeno, ya que estos medicamentos pueden afectar la función renal y empeorar la condición en pacientes con problemas renales preexistentes. Algunas personas con antecedentes de asma o alergias respiratorias, pueden experimentar exacerbaciones de sus síntomas al tomar antiinflamatorios no esteroideos como el Ibuprofeno, por lo que se recomienda precaución y consulta médica antes de usar estos medicamentos.

Es importante destacar que esta lista de contraindicaciones no es exhaustiva, y siempre se debe consultar a un médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento. El conocimiento y la comprensión de las contraindicaciones, son fundamentales para garantizar un uso seguro y efectivo de estos fármacos.