

JUDITH HERRERA C.

Un tema que preocupa a los expertos, a tal punto que varios creen que se debe comenzar desde ya a planificar medidas, es la baja vacunación en mayores de 60 años, uno de los grupos de alto riesgo en salud no solo por patologías respiratorias, sino que por enfermedades crónicas en general.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, la campaña de inmunización contra la influenza solamente logró una cobertura de 65% en este tramo: de 3,8 millones, se pudo abarcar a solo 2,4 millones de personas.

En el caso del refuerzo contra el covid-19, las cifras son incluso peores: de 3,1 millones de mayores de 60 años, solo se vacunó a 931 mil, es decir, no se alcanzó la meta en un 70% de la población objetivo (ver infografía).

Las razones tras el insuficiente nivel de la campaña

Al observar los datos de atenciones de urgencias y hospitalizaciones en el sistema público de mayores de 65 años por causas respiratorias durante el invierno, se evidencia un alza importante: las internaciones aumentaron 13,5% entre el año pasado y este (de 12,6 mil a 14,3 mil).


Asimismo, las atenciones de urgencia por estas patologías crecieron 5,9% en el mismo período. Las por influenza son las más notorias: se incrementaron 49% y pasaron de 2.016 a 3.021.

Según los expertos, los bajos números de inmunización muestran un escenario que debe abordarse cuanto antes. Paula Daza, directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la U. del Desarrollo, plantea que "es lamentable que una estrategia que


Durante el invierno, en influenza llegó solo a 65%, mientras que atenciones subieron 49%: Preocupa bajo alcance de vacunación de adultos mayores y alza de atenciones de urgencia

En el caso del refuerzo contra covid-19, el número es aun menor: 29%. Expertos plantean adelantar campañas de concientización sobre importancia de estar protegido de los virus respiratorios.

La evolución en la inmunización del grupo



Atenciones de urgencia en hospitales durante invierno de mayores de 65 años



Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud

siempre ha logrado ciertos indicadores tan positivos esté tan lejos de su objetivo".

La también exsubsecretaria de Salud Pública apunta que "es importante reforzar medidas e incluso adelantarlas, por ejemplo, concientización desde fines de febrero de la vacunación, o centrar las estrategias en mejorar el acceso y en las necesidades específicas del grupo etario". Un elemento crucial es "ir adaptando las campañas a la comunicación de las personas mayores que usan otros medios como la televisión, la radio, y no tanto las redes sociales", dice.

Robinson Cuadros, presidente del Comité Latinoamericano y del Caribe de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriátrica, indica que "hay varios factores que tenemos que poner sobre la mesa cuando hay baja cobertura en vacunación: acceso, oportunidad y atención, todo pensando en retomar la confianza en las vacunas".

Así, comenta que "durante la pandemia y pospandemia se comunicó la vacunación mediante el miedo de morir, de no poder movilizarse, de no poder acceder a servicios; era la forma de lograr que la gente se vacunara, pero hoy vivimos las con-

secuencias de que no exista esa percepción de riesgo".

César Bustos, infectólogo de Clínica Universidad de los Andes, coincide en que ha bajado la sensación de peligro y de utilidad de la inmunización: "La gente se vacunaba, porque era necesario para el pase de movilidad, por ejemplo". Afirma que existe un tema "de responsabilidad personal; la gente ve como un esfuerzo vacunarse".

En esa línea, Cuadros añade que se debe transmitir un men-

“Es importante reforzar medidas e incluso adelantarlas, por ejemplo, concientización desde fines de febrero de la vacunación, o centrar las estrategias en mejorar el acceso”.

PAULA DAZA
 EXSUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

saje que "sea de la responsabilidad conmigo mismo y con mi familia, de prevenir una enfermedad o peor, un deceso".

Daza también apunta a que otra estrategia "son los sistemas de recordatorio y seguimiento, porque ayudan a saber si me vacuné o si me toca de nuevo. Hay distintas formas: mensajes de texto y llamadas telefónicas a los pacientes".

A eso suma que "cuando la persona vaya a un control se le recuerde que debe vacunarse e, incluso, se le dé la opción de hacerlo en ese momento".

